

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

コザックガード®軟膏

水虫治療薬

第2類医薬品

販売名：コザックガード軟膏

コザックガード軟膏は、水虫の原因菌(白せん菌)に対してすぐれた抗菌作用を発揮するトルナフタート配合の水虫治療薬です。塗布部位に薄い被膜をつくり、薬剤が患部によくとどまります。また、マクロゴール基剤が患部からの分泌物を吸収しますので、とくに湿潤(ジュージュー)型の水虫に適しています。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が顔面又は広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等其他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】


みずむし、ぜにたむし、
いんきんたむし

【用法・用量】

1日1～2回、適量を患部に塗布してください。

【☆ワンポイントアドバイス☆】

「いんきんたむし」は、主として、足のつけ根・太ももの内側に白せん菌が感染し、発症する疾患です。まれに、陰のう部にも感染することがあります。



陰のう部の疾患には、本剤は使用できませんので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

【成分】 (1g中)

成分	分量	はたらき
トルナフタート	20 mg	水虫の原因菌(白せん菌)に対してすぐれた抗菌作用を發揮します。
フタル酸ジエチル	50 mg	角質溶解剤の一種で、有効成分の浸透性を高めます。
グリチルレチン酸	5 mg	抗炎症、抗アレルギー作用等により患部の炎症を抑えます。
ジブカイン塩酸塩	2 mg	患部の痛みやかゆみを抑えます。

添加物としてジブチルヒドロキシトルエン、マクロゴール、ベヘニルアルコール、ポビドン、ラウロマクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。
- (5)合成樹脂(スチロールなど)を軟化したり、塗料を溶かすことがありますので、メガネの枠、塗装家具、床(フローリングなど)等につかないようにしてください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元

全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15