

第2類医薬品

フットロック

みずむし・たむし治療薬

優れた殺菌効果
1日1回
簡単：スプレータイプ

みずむし・たむしは、白癬菌が趾間や足底の皮膚角層で増殖し、水疱、炎症による赤みや強い痒みを起こす疾患です。フットロックはこのようなみずむしを治療する液状の外用药です。

特徴

- 1) 白癬菌に対し、優れた殺菌効果を持つブテナフィン塩酸塩を配合しています。
- 2) 1日1回のご使用で効果を発揮します。
- 3) 液剤なので、使用後のべたつき感がなく、使用部位が乾きやすい製剤です。
- 4) 逆さまにしても使えるスプレータイプで足の裏部分にも薬液が簡単に噴霧できます。

フットロックは次のような症状にご使用いただけます。

趾間型足白癬

足趾の間の皮膚が乾燥して赤くなり、皮が薄くなりむけていくような症状で、強い痒みを伴います。夏季には表皮が白くふやけて、びらんや亀裂を生じ、重症化する場合があります。

小水疱型足白癬

足底、特に土踏まずの部分にわずかに赤みを伴う半米粒大(5mm以下)の水疱ができる症状で、一般的には痒みを伴います。重症化するとびらんや亀裂を伴います。



外用療法によるみずむしの治療は完全に治るまでに約1～2ヶ月はかかりますので、症状がなくなったあとも最低1ヶ月間は気長にご使用を続けてください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
(2) 湿疹
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 乳幼児
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が顔面又は広範囲の人
(5) 患部が化膿している人
(6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に噴霧する

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください
- (3)症状が悪化した場合は、直ちに使用を中止して、皮膚科専門医の診察を受けてください
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (5)外用にのみ使用してください

フットロックの使い方

簡単スプレータイプ！
逆さまにしてもスプレー
できます。

白癬菌は、症状がない所にも繁殖している可能性がある
ので、広い範囲にお薬を
スプレーしてください



みずむし治療のコツ

- * 患部は清潔に保つようしてください
- * 靴を履く時間はできるだけ短くする工夫をしてください
- * 靴は2～3足を履き回し、靴内部の湿気を取るようしてください
- * 靴下は5本指靴下や通気性が良い素材を選ぶようしてください
- * 浴室の足拭きマットやスリッパの消毒を心がけるようしてください
- * ご家族が感染している場合は一緒に治療するようしてください

清潔のためのフットケア・足浴

みずむしの感染や悪化を防ぐ方法として足を清潔に保つことはとても重要です。

〈クエン酸・尿素足溶液の作り方〉洗面器にお湯約2Lを入れて、尿素原液5ccとクエン酸2.5g(計量スプーン小匙1/2杯分)を入れて溶かします。この液に足を浸して足浴を行います。

尿素原液とは、尿素25gを水で溶かして250mLとしたものです。(尿素10%溶液)

注意：この足溶液は酸性(pH2～3)ですので、みずむしの症状が悪化して亀裂やかぶれ症状が有る時や足に傷等有る時にはご使用にならないください。

【成分・分量】 本品100mL中

抗真菌成分	ブテナフィン塩酸塩	みずむしの原因菌である白癬菌に対して強い殺菌効果を発揮します。	1.0g
かゆみを抑える成分	リドカイン	強い痒みを抑えます。	2.0g
	ℓ-メントール	痒みを抑え、清涼感を与えます。	1.0g

添加物：1,3-ブチレングリコール、エタノール、希塩酸、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)火気に近づけないでください
- (4)使用済みの容器は火中に投げないでください
- (5)本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください
- (6)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください
- (8)汚染を避けるため、他の人と共用しないでください
- (9)合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがあるので、床や家具等につかないようしてください



製造販売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931