

マイボ[®] 第2類医薬品

水虫 粉末タイプ パウダースプレー^a

よく振って
使用すること

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

マイボ[®] 第2類医薬品

水虫パウダースプレー^a

特徴

- ジクジクした患部をパウダーがサラッと乾燥させます。
- リドカイン・クロタミトン・L-メントールのトライアングル処方がかゆみを効果的に抑えます。
- スプレータイプなので手で患部に触れる必要がありません。

【用法・用量】1日数回、患部に適量を噴射する
 <用法・用量に関する注意> (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) 目には入れないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けること (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (4) 外用にのみ使用すること (5) 患部まで10cmの距離で噴射すること (6) 同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないこと (7) 用法・用量を厳守すること (8) よく振って使用すること
 <保管および取扱い上の注意> (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 火気に近づけないこと (4) 使用済みの容器は火中に投じないこと (5) 水まわりや湿気の多い所では、缶が錆びて中身が漏れたり破裂する危険があるので置かないこと (6) 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音がしなくなるまで押し当ててガスを抜くこと (7) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと (9) 合成樹脂や塗料等を変質させることがあるので本剤がつかないようにすること (10) 逆さにして使用すると最後まで使用できなくなります



マイボ[®] 第2類医薬品 水虫パウダースプレー^a

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ① 炎や火気の近くで使用しないこと。② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。④ 火の中に入れてはいけないこと。⑤ 使い切った捨てて捨てること。
 高压ガス:LPG

第一石油類
 (危険等級Ⅱ:エタノール)
 15mL 火気厳禁



使用期限は缶底面及び箱に記載

製造販売元
 株式会社タカミツ
 名古屋市中区上飯田東町4-68-1

お問い合わせ先
 ☎0120-459533
 受付時間 9:00~17:00(土・祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



4 987487 103492

マイボ[®] 第2類医薬品

水虫 粉末タイプ パウダースプレー^a

ジクジクした 水虫に

パウダーがサラッと 乾燥させます!

かゆみを抑える

リドカイン・クロタミトン・L-メントール配合

ご使用の際には缶を上下によく振ってご使用下さい。

内容量 90g 第2類医薬品

販売名
マイボ 水虫パウダースプレー^a

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜいたむし
 【成分・分量】 90g中
 クロトリマゾール……………150mg
 リドカイン……………300mg
 クロタミトン……………750mg
 グリチルレチン酸……………15mg
 L-メントール……………150mg
 酸化亜鉛……………1,500mg
 添加物:セスキオレイン酸ソルビタン、
 二酸化ケイ素、タルク、エタノール、
 LPG

△【使用上の注意】

- ☒ してはいけないこと
 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】
 次の部位には使用しないこと
 (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等
 (2) 湿疹
 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

■【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が顔面又は広範囲の人 (5) 患部が化膿している人 (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜいたむし」かかはっきりしない人(陰のうにかゆみ、ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い)
- 使用后、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ、乾燥感、ヒリヒリ感があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用期限

製造番号

90g