

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布
してください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を
お守りください。
- (2)患部やその周囲が汚れ
たまま使用しないでくだ
さい。
- (3)小児に使用させる場合
には、保護者の指導監
督のもとに使用させてく
ださい。
- (4)目に入らないよう注意し
てください。万一、目
に入った場合には、すぐ
に水またはぬるま湯で洗
い、直ちに眼科医の診療
を受けてください。
- (5)外用にのみ使用して
ください。
- (6)本剤のついた手で目や
粘膜にふれないでくだ
さい。



新大和漢方株式会社



温海 琳雄
西田 道隆

副作用被害救済制度
TEL:0120-149-931

水虫に効く デルママイコクリーム TF

第②類医薬品 50g



第②類医薬品

50g

販売名

デルママイコクリームTF

【成分・分量】1g中

テルビナフィン塩酸塩…10mg
リドカイン…20mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩
…5mg
グリチルレチン酸…5mg
イソプロピルメチルフェノール
…3mg
クロタミトン…50mg
β-メントール…20mg
添加物：ステアリン酸グリセリン、
ステアリン酸ポリオキシ
シラン、ジメチルポリシロキサン、
プロピレングリコール、1,3-ブ
チレングリコール、エデト酸
Na水和物、pH調節剤、その
他4成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿
気の少ない涼しい所に密
封して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に
保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えない
でください(誤用の原因に
なったり品質が変わるこ
とがあります)。
- (4)使用期限(外箱及び容器
に記載)を過ぎた製品は
使用しないでください。ま
た、使用期限内であって
も、開封後はなるべく速
やかに使用してください。

お問い合わせ・発売元

新大和漢方株式会社

福岡県福岡市東区千隈3-16-1

TEL:0120-702-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

こちらから

開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症
状(例えば発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起
こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、
膣等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひびく患
部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登
録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦または妊娠している可能性のある
人。
(3)乳幼児。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。
(5)患部が顔面または広範囲の人。
(6)患部が化膿している人。
(7)「湿疹」「みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし」か「かがはきりしいない人」。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある
場合は、湿疹等他の原因による場合
が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるので、直ちに使用を中止
し、この説明文書を持って医師、薬剤師また
は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・ 落屑(フケやアカのように皮が が剥がれる)、ただれ、乾燥・ つっぱり感、皮膚の亀裂、痛 み、色素沈着、発疹・発赤*、か ゆみ*、はれ*、じんましん*

*全身に発現することがあります。

3. 2週間使用しても症状がよくならない
場合や、本剤の使用により症状が悪化した
場合は使用を中止し、この説明文書を持
って医師、薬剤師または登録販売者に相談
してください