

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗
布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量
をお守りください。
- (2) 患部やその周囲が汚れ
たまま使用しないでく
ださい。
- (3) 小児に使用させる場合
には、保護者の指導監
督のもとに使用させて
ください。
- (4) 目に入らないよう注意し
てください。万一、目に入
った場合には、すぐに
水またはぬるま湯で洗
い、直ちに眼科医の診療
を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してく
ださい。
- (6) 本剤のついた手で目や
粘膜にふれないでくだ
さい。

第②類医薬品

販売名：
デルマロッククリームTF
内容量：50g

副作用被害救済制度
TEL:0120-149-931

白虎漢方堂

第②類医薬品

50g

デルマロッククリーム

水虫に効く

【成分・分量】1g中

テルビナフィン塩酸塩…10mg
リドカイン……………20mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩
……………5mg
グリチルレチン酸……5mg
イソプロピルメチルフェノール
……………3mg
クロタミトン……………50mg
ℓ-メントール……………20mg
添加物：ステアリン酸グリセリン、
ステアリン酸ポリオキシ
シル、ジメチルポリシロキサン、
プロピレングリコール、1,3-ブ
チレングリコール、エデト酸
Na水和物、pH調節剤、その
他4成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿
気のない涼しい所に密
栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所
に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えない
でください（誤用の原
因になったり品質が変
わる場合があります）。
- (4) 使用期限（外箱及び容器
に記載）を過ぎた製品は
使用しないでください。ま
た、使用期限内であって
も、開封後はなるべく速
やかに使用してください。

お問い合わせ・発売元

白虎漢方堂株式会社

福岡県福岡市早良区千隈3-16-1

TEL:0120-137-866

（午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く）

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号



ここから

開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

△使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー
症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、はれ等）
を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば口腔、鼻
腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患
部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登
録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠している可能性のあ
る人。
(3) 乳幼児。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。
- (5) 患部が顔面または広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし」かがはつきりしない人。
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状が
ある場合は、湿疹等他の原因による
場合が多い。）
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに使用を
中止し、この説明文書を持って医師、薬剤
師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・ 落屑（フケやアカのように皮ふ が剥がれる）、ただれ、乾燥・ つっぱり感、皮ふの亀裂、痛 み、色素沈着、発疹・発赤*、か ゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することがあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない
場合や、本剤の使用により症状が悪化し
た場合は使用を中止し、この説明文書
を持って医師、薬剤師または登録販売者
に相談してください