

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布
してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を
お守りください。
- (2) 患部やその周囲が汚れ
たまま使用しないでくだ
さい。
- (3) 小児に使用させる場合
には、保護者の指導監
督のもとに使用させて
ください。
- (4) 目に入らないよう注意し
てください。万一、目
に入った場合には、すぐ
に水またはぬるま湯で洗
い、直ちに眼科医の診療
を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用して
ください。
- (6) 本剤のついた手で目や
粘膜にふれないでくだ
さい。

水虫に効く オーラロックス[®] 日本生薬漢方

第②類医薬品

50g



若老人

湯 角 嚙 癩
漏 田 疥 癬

副作用被害救済制度
TEL:0120-149-931

第②類医薬品

50g

販売名

オーラロックスクリーム

【成分・分量】1g中

テルピナフィン塩酸塩……10mg
リドカイン……………20mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩
……………5mg
グリチルレチン酸……5mg
イソプロピルメチルフェノール
……………3mg
クロタミトン…………50mg
L-メントール…………20mg
添加物：ステアリン酸グリセリン、
ステアリン酸ポリオキシ
シル、ジメチルポリシロキサン、
プロピレングリコール、1,3-ブ
チレングリコール、エデト酸
Na水和物、pH調節剤、その他
4成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿
気の少ない涼しい所に密
栓して保管してください。
- (2) 小児の手が届かない所に
保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えない
でください(誤用の原因に
なったり品質が変わるこ
とがあります)。
- (4) 使用期限(外箱及び容器
に記載)を過ぎた製品は
使用しないでください。ま
た、使用期限内であって
も、開封後はなるべく速や
かに使用してください。

お問い合わせ・発売元

日本生薬漢方株式会社

福岡県福岡市早良区千隈3-16-1

TEL:0120-151-419

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

こちら

開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症
状(例えば発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起
こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、
膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患
部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登
録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠している可能性のある
人。
(3) 乳幼児。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。
- (5) 患部が顔面または広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし」かかはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある
場合は、湿疹等他の原因による場合
が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるので、直ちに使用を中止
し、この説明文書を持って医師、薬剤師また
は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・ 落屑(フケやアカのように皮ふ が剥がれる)、ただれ、乾燥・ つっぱり感、皮ふの亀裂、痛 み、色素沈着、発疹・発赤*、か ゆみ*、はれ*、じんましん*

*全身に発現することがあります。

3. 2週間連続使用しても症状がよくならない
場合や、本剤の使用により症状が悪化した
場合は使用を中止し、この説明文書を持
って医師、薬剤師または登録販売者に相談
してください