

第2類医薬品

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

タロン(みずむし薬)

みずむし・たむしは、白癬菌(カビの一種)が皮ふの表面(角質層内)に病巣を作って起こる皮ふ病のひとつです。みずむし・たむしが完治しにくいのは、この白癬菌の生命力が強く、また薬剤が角質層の深部へ浸透しづらいからです。

タロンは、抗白癬菌作用のあるヒノキチオールやウンデシレン酸をはじめ、患部を殺菌・消毒するフェノール、角質を軟化させて薬剤を浸透しやすくするサリチル酸を配合した液状タイプのみずむし薬です。

特 長

- 速乾性でサラッとした使用感
- 乾燥型のみずむしに



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)、陰のう、外陰部など。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が顔面または広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれなどの症状がある場合は、湿疹など他の原因による場合が多い。)

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1～3回、患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (6)使用時には、床や家具などに付着しないように、ご注意ください。また、塗布後は、完全に乾くまで歩行などはおさげください。

成分・分量 本品100mL中

成分	分量	はたらき
ヒノキチオール	0.1g	白癬菌などを殺菌します。
フェノール	2.0g	患部を殺菌・消毒します。
ウンデシレン酸	5.0g	白癬菌などの発育をおさえます。
サリチル酸	3.0g	角質を軟化させて、薬剤を浸透しやすくします。

添加物：酢酸ビニル樹脂、酢酸エチル

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)液のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)合成樹脂塗装品の塗料を溶かすことがあるので、液をこぼしたり、床や家具などに付着しないように、注意してください。
- (7)期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 0120-875-710まで

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社

神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元

三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

YKMI805

1803-AHI