

第2類医薬品

水虫・たむし用薬

ドキンピ水虫液

「ドキンピ水虫液」は、生薬木槿皮(ムクゲの枝および幹の皮)、サリチル酸、安息香酸を配合した殺菌・皮膚軟化作用のある水虫薬です。

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣、肛門等)、陰のう、外陰部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 乳幼児
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が顔面又は広範囲の人
 - (5) 患部が化膿している人
 - (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人 (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕 1mL中

(有効成分)

木槿皮エタノール抽出液…0.37mL 安息香酸……………120mg

サリチル酸……………60mg

(添加物)

エタノール

〔効能・効果〕

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

〔用法・用量〕

清潔にした患部に適量を1日1～2回塗布する。

※ご使用の際は、容器の口を患部に近づけ指で容器を軽く押しますと液が滴下され、自然に患部に広がります。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 本剤はアルコールを含んでいますのでしみることがあります。
- (6) いんきんたむしに使用する場合には、皮膚に対する刺激が強いのので、極く少量ずつ塗布してください。
- (7) 皮膚の弱い人は、入浴直後にお使いになると、しみて痛みを感じることがあります。このような人は、入浴30～60分後に塗布されたり、量を減らすか、又は脱脂綿にふくませて軽くたたくようにしてつけるなど、お肌に合わせてお使いください。

※水虫やたむし類は、ある種の白癬菌の寄生によって起こる皮膚の疾患です。水虫は手足の指の間や、手掌、足裏に多発し、水疱ができたり、皮膚が硬化してボロボロになったり糜爛(びらん)状を呈したりして、ひどい痒みや痛みを伴い苦痛を与えるものです。この皮膚疾患は治療が長くかかり、再発しやすいので完全に治るまで根気よく治療を続けることが肝心です。

〔保管及び取扱上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓してまっすぐ立てて保管してください。また、万一結晶が析出する場合がありますが薬効には何ら変わりありませんのでそのままお使いください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調の異なることがあります。効果には変わりありません。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

〔お問い合わせ先〕 **大商株式会社** TEL. 0744 (52) 3931

発 売 元

大商株式会社

奈良県高市郡高取町観覚寺814-5

製造販売元

松浦薬業株式会社

愛知県名古屋市中区円上町24-21