

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

水虫治療薬

第2類医薬品

雪の元 キンピ液

みずむし・たむし類は、かびの一種である白癬菌によって起こる寄生性皮膚病で、強いかゆみを伴います。この白癬菌は、皮膚の表皮の角質層に寄生しますので、その治療には抗白癬菌作用を有する薬剤を角質層にまで浸透させることが必要です。また、これらの皮膚病は、強いかゆみを伴いますので患部をかいたりして悪化させないようにかゆみをしずめることも大切です。

本剤は、生薬由来の抗白癬菌作用を有する木槿皮チンキに加えて殺菌・消毒作用のある安息香酸及び薬剤の角質層への浸透性をよくする角質軟化作用を有するサリチル酸が配合され、みずむし、たむしなどに優れた治療効果があります。また鎮痒剤としてクロタミトンが配合され、不快なかゆみを速やかにしずめます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、陰等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 乳幼児。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が顔面又は広範囲の人。
(5) 患部が化膿している人。
(6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

《効能・効果》

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

《用法・用量》

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

《成分・分量》 本品(100mL)中

成分	分量	はたらき
木樨皮チンキ (原生薬4gに相当)	10.0mL	生薬由来の抗白癬菌剤で、抗菌作用とともに鎮痒作用を有します。
サリチル酸	8.0 g	角質軟化作用を有し、患部への薬剤の浸透性をよくします。
安息香酸	6.0 g	殺菌・消毒作用があります。
クロタミトン	5.0 g	かゆみにすばやく効力を発揮します。
添加物として、パラベン、エタノールを含有する		

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元 **株式会社 雪の元本店**
奈良県橿原市大谷町182番地