

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

みずむし、たむしに1日1回

販売名：すあしの健

〈みずむし・たむし用薬〉

＜商品の特徴＞

みずむし・たむしは、白癬菌というカビが皮膚の角質層に侵入し、寄生しておこる疾患で、かゆみや痛みを伴うことが多くあります。

7つの有効成分配合で、みずむし・たむしのつらい諸症状に、1日1回の使用で効きます。

- ・殺菌成分：ブテナフィン塩酸塩、イソプロピルメチルフェノール
- ・かゆみ止め成分：クロタミトンリドカイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩
- ・抗炎症成分：グリチルレチン酸
- ・清涼感成分：dI-カンフル

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. **次の人は使用しないでください**
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. **次の部位には使用しないでください**
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
(2) 湿疹。
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. **次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 乳幼児。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 患部が顔面又は広範囲の人。
(6) 患部が化膿している人。
(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. **使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、亀裂、乾燥感、ヒリヒリ感

3. **2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中

成分	分量	はたらき
ブテナフィン塩酸塩	1.0g	角質層に浸透し、原因菌(白癬菌)を殺菌します。
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.25g	かゆみを鎮めます。
クロタミトン	5.0g	かゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	殺菌作用により患部を清潔に保ちます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用によりかゆみを鎮めます。
dI-カンフル	1.0g	患部に清涼感を与え、かゆみを鎮めます。

添加物：流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ベヘニルアルコール、セタノール、ステアリン酸ポリオキシリル、モノステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、トコフェロール酢酸エステル、キサンタンガム、パラベン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
6. チューブの口に穴を開ける際にチューブを強く握りすぎるとクリームが多く出る場合がありますのでご注意ください。

【水虫治療のポイント】

- 患部はいつも清潔にし、靴下や履物なども清潔なものを使用しましょう。
- 白癬菌は、症状のあらわれている範囲より広がって寄生していることが多いため、薬剤は広めに塗布しましょう。
- かゆみなどの症状がなくなっても再発することがあるため、しばらくの間は根気よく継続して治療を続けましょう。
- 靴下や履物は通気性の良いものを選び、患部のムレを防ぎ乾燥させることを心がけましょう。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

【発売元】

さくらフォレスト株式会社

福岡県福岡市中央区警固2丁目12-23

さくらの森相談窓口 ☎0120-842-555

【月～金】9:00～18:00【定休日】土・日・祝

【製造販売元】

株式会社 雪の元本店

奈良県橿原市大谷町182番地

MADE IN JAPAN

2501-TYS