



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

アルテナスαMX液

水虫・たむし治療薬

ミコナゾール硝酸塩
ヒノキチオール配合

水虫、たむしは白癬菌というカビ(真菌)が皮膚の角質層に寄生しておこる疾患です。白癬菌が皮膚表面の角質層のケラチン質を侵すことによって激しいかゆみが起こります。アルテナスαMX液は、ミコナゾール硝酸塩、ヒノキチオールが白癬菌の生育を阻止し、クロタミトン、リドカインが痛み・かゆみを速やかに抑えて、不快な水虫やたむしの症状を改善します。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 乳幼児。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
 - (5) 患部が化膿している人。
 - (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】1日1～2回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100mL中


ミコナゾール硝酸塩……………	1.0g	クロタミトン……………	10.0g
リドカイン……………	2.5g	グリチルレチン酸……………	0.2g
ヒノキチオール……………	0.1g	l-メントール……………	3.0g
dl-カンフル……………	4.0g	クロルフェニラミンマレイン酸塩…	0.5g
サリチル酸……………	2.0g		

添加物としてマクロゴール、エデト酸ナトリウム、エタノール、pH調節剤を含有します。

〈成分に関連する注意〉アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。

〈容器の使用方法〉

- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2～3回空押しして中の空気を抜いてください。
(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです)
- 使用するときは容器を downward または斜めに、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます)



水虫治療のポイント

- ① **根気よく継続治療をする**
かゆみがなくなっても、すっかり治るまで根気よく治療を続け再発を防ぎましょう。
- ② **患部を乾燥させる**
通気性の悪い靴下やブーツ、ゴム長靴は好ましくありません。むれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。
- ③ **衣類を清潔にする**
靴や靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔に保ち感染に注意しましょう。
- ④ **患部をよく洗って清潔にする**
白癬菌の増殖や二次感染を防ぐため、患部をよく洗い、乾燥させて清潔に保ちましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)
- (5) 火気に近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投げないでください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (7) 合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具等につかないようにしてください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ 06-6351-2100(代表) 受付時間 9:00～17:00(土日祝日を除く)

 **奥田製薬株式会社**

大阪市北区天満1丁目4番5号
<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>