

ACCOOP クミアイ  
**ミコナース**  
水虫薬

### 特徴

- 水虫、たむしの原因である白癬菌に対して、すぐれた殺菌効果を発揮するミコナゾール硝酸塩を主成分とした水虫薬です。
- クロタミトン、リドカイン、グリチルレチン酸、Q-メントールが患部の痛みやかゆみなどの不快な症状をしずめます。
- べたつかず、さわやかな清涼感のある液剤です。
- 手を汚さずに手軽に使えます。



### 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

#### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 乳幼児
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が顔面又は広範囲の人
  - (5) 患部が化膿している人
  - (6) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

## 用法・用量

1日2～3回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

### 容器の使用方法

#### 使用前



使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。(暑い時期、温度の高い場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、内圧が高まり、薬液が多くでることがありますので、これを防ぐためです)

#### 使用中



患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあてて塗布してください。(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなりません)

## 成分・分量

100mL中

成分	含量	はたらき
ミコナゾール硝酸塩	1.0g	水虫、たむしの原因菌である白癬菌に対して強力な殺菌作用を発揮します。
クロタミトン	10.0g	白癬菌による不快なかゆみをしずめます。
リドカイン	2.0g	かゆみをおさえ、痛みをしずめます。
グリチルレチン酸	0.5g	白癬菌によって引き起こされた患部の炎症をしずめます。
0-メントール	1.0g	さわやかな清涼感により、不快な症状をやわらげます。

添加物として、マクロゴール、エタノールを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 本剤の付いた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6) アルコールで変質するおそれのあるもの(メガネのフレーム、塗装家具、フローリングの床など)には本剤が付かないようにしてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎ 0238(46)2013  
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

製造販売者 協同薬品工業株式会社  
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930