

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**ブテナフィン塩酸塩**  
(抗真菌成分)

+

**リドカイン**  
(かゆみ止め成分)

第2類医薬品

# メディタム 水虫クリーム

抗真菌薬 ブテナフィン塩酸塩が患部の角質層に浸透し、1日1回の使用で水虫・たむしの原因菌を効果的に殺菌するとともに、リドカインがかゆみを鎮めます。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください  
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないでください
  - 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
  - 湿疹。
  - 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 乳幼児。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 患部が顔面または広範囲の人。
  - 患部が化膿している人。
  - 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等、他の原因による場合が多い。）
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂

- 2週間位使用しても症状がよくなりえない場合、また、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

## 【成分・分量】

1g中：ブテナフィン塩酸塩……………10mg

リドカイン……………20mg

添加物：ステアリン酸、セトステアリルアルコール、ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリン酸グリセリン、トリイソオクタン酸グリセリン、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ジメチルポリシロキサン、pH調節剤

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

### 〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ラクール薬品販売株式会社 消費者相談窓口  
0120-86-8998 月～金曜日 9:00～17:00（祝祭日を除く）

発売元

ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

三友薬品株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

A237-091C