

50A0760-1

第2類医薬品

販売名:マーカムTFクリームEX 水虫治療剤
ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
(2)湿疹(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

⚠ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)乳幼児(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)患部が顔面又は広範囲の人(6)患部が化膿している人(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い。) 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑、落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん* *：全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お問い合わせ・発売元
新大和漢方株式会社
福岡県福岡市早良区千隈3-16-1
TEL:0120-702-866
(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

製造販売元
新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地

副作用情報検索制度
TEL:0120-149-931

製造番号

使用期限

かかとや爪まわりなどの水虫に効く

マーカムTFクリームEX

第2類医薬品 50g

水虫治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗って清潔にしてください。
2. 乾燥 患部の乾燥を心がけてください。
3. 根気 かゆみなどの症状がなくなった後も、約1ヶ月は根気よく治療を続けてください。

【効能・効果】 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください。
<用法・用量に関する注意>
(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5)外用にのみ使用してください。(6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

【成分・分量】 (100g中)
テルビナフィン塩酸塩1g、リドカイン2g、グリチルレチン酸0.5g、ジフェニヒドラミン塩酸塩0.5g、イソプロピルメチルフェノール0.3g含有
添加物として、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ミリスチン酸オクチルドデシル、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)使用期限(ケース及びチューブに表示)を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

開封口

かかとや爪まわりなどの水虫に効く

マーカムTFクリームEX

第2類医薬品 50g

0 000000 000000