

この説明書は、ご使用前によく読んでください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

みずむし・たむし治療薬

第②類医薬品

マイキュロンスカッシュ液 マイキュロンスカッシュクリーム

MAI-CU-RON

特長

みずむし・たむしは、皮膚表面の角質層に白癬菌というカビの1種が侵入しておこる疾患で、強いかゆみを伴うタイプや、かゆみはそれ程でなく角質が増殖して皮膚が硬くなるタイプなどがあります。白癬菌は湿り気のある暖かい場所を好み、角質層の深部を棲家とするため薬剤が浸透し難く、根治の難しい疾患です。本剤は、皮膚に長く留まる性質のある殺菌剤塩酸ブテナフィンを配合していますから、1日1回の使用で効果を発揮し、多忙な現代人の生活スタイルにピッタリなみずむし・たむしの治療薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の方は使用しないでください。
塩酸ブテナフィン製剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある方
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
 - (2)湿疹
 - (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

👤 相談すること

1. 次の方は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている方
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる方
 - (3)乳幼児
 - (4)本人又は家族がアレルギー体質の方
 - (5)薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある方
 - (6)患部が顔面又は広範囲の方
 - (7)患部が化膿している方
 - (8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない方(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)使用后、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただ

れ、水疱、亀裂等の症状があらわれた場合
(2)2週間位使用しても症状の改善がみられない場合や、本剤の使用により症状が悪化(病巣が使用前より広がる等)した場合

[効能・効果]

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

[用法・用量]

1日1回、適量を患部に塗布してください。

[用法・用量に関連する注意]

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

[成分・分量]

成分	含量(1 mL又は1g中)	作用
塩酸ブテナフィン	10mg	みずむし・たむしの原因菌である白癬菌を殺菌します。

添加物：液 マクロゴール、水酸化Na、塩酸、エタノール
クリーム グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラベン、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、塩酸

[成分に関連する注意]

液はアルコールを含有するため、塗布時にしみることがあります。

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用を避け品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。
- (5)火気に近づけないでください(液)。
- (6)アルコール類、油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(化学繊維、合成樹脂、家具、床等)への付着は避けてください。

みずむし治療のポイント

- 1.清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。
- 2.乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良くよく乾燥。
- 3.根気 お風呂上りの薬剤治療、かゆみ消えても1ヶ月。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いいたします。【受付時間9：00～17：00(土、日及び祝日は除く)】

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号076-472-0361
〒930-0344 富山県中新川郡上市町森元町7-2