

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

みずむし・たむし治療薬 フットラック

第2類医薬品

製品の特徴

水虫・たむしは、皮膚表面の角質層に白癬菌というカビ（真菌）の一種が侵入して起こる皮膚病で、かゆみが殆どなく乾燥したものから、かゆみが強くジクジクしたものまで様々な病型があります。原因菌である白癬菌が、薬物の浸透し難い角質層の奥に潜んでいるため根治が難しい疾患です。本剤は、角質層に24時間留まって効果が持続する殺真菌成分テルビナフィン塩酸塩に加えて、かゆみを止めるための3つの成分、クロタミトン、グリチルレチン酸、l-メントールを配合し、1日1回の使用で効果をあらわす、多忙な現代人の生活スタイルにピッタリの水虫・たむし治療薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
(2) 湿疹
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠している可能性のある人
(3) 乳幼児
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 患部が顔面又は広範囲の人
(6) 患部が化膿している人
(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



関係部位	症状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、 ^{りんせつ} 鱗屑・ ^{らくせつ} 落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくなり場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

（必ず裏面もお読みください）

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

<プッシュ式液体容器の使用方法>

・容器を下向きにして、先端を患部に軽く押しあてて塗布してください。



【成分・分量】

成分	分量 (1g中)	作用
テルビナフィン塩酸塩	10mg	みずむし・たむしの原因菌である白癬菌を殺菌します。
クロタミトン	50mg	特異的にかゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	非ステロイド性の抗炎症作用によりかゆみ等の炎症症状を抑えます。
L-メントール	20mg	患部に冷感を与えかゆみを軽減します。

添加物：プロピレングリコール、水酸化Na、塩酸、ハアセチルしょ糖、エタノール

【成分に関連する注意】

本剤はアルコールを含有するため、塗布時にしみる場合があります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して、立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。



水虫治療のポイント


1 清潔

患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。



2 乾燥

靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良くよく乾燥。



3 根気

お風呂上りの薬剤治療、かゆみ消えても、もう1ヶ月。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までお願いいたします。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号 076-472-0361

[受付時間 9:00~17:00 (土、日及び祝日は除く)]

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

発売元  山崎帝國堂 千葉県柏市豊四季7-3番地1

製造販売元 新生薬品株式会社 富山県中新川郡上市町横越16番1