

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

みずむし・たむし治療薬

オロフトール[®]EXクリーム

特徴

- テルビナフィン塩酸塩の優れた殺真菌作用と角質浸透性により、1日1回の塗布でみずむし・たむしに効果を発揮します。
- リドカイン、クロタミトンが患部のかゆみを鎮めます。
- イソプロピルメチルフェノールが雑菌の繁殖を抑えます。
- グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。
- L-メントールが清涼感を与え、患部のかゆみを緩和します。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目や目の周囲、粘膜(例えは、口腔、鼻腔、瞼等)、陰のう、外陰部等。
 - (2) 湿疹。
 - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 乳幼児。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
 - (6) 患部が化膿している人。
 - (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑 ^{けんじゆ} ・落屑 ^{らくじゆ} (フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤 [*] 、かゆみ [*] 、はれ [*] 、じんましん [*]

* : 全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(必ず裏面もお読みください)

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

【成分・分量】(1g中)

成分	分量	作用等
テルビナフィン塩酸塩	10mg	みずむし・たむしの原因である白癬菌を殺菌します。
リドカイン	20mg	局所麻酔作用により、患部のかゆみを鎮めます。
クロタミトン	50mg	患部のかゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	3mg	雑菌の繁殖を抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	患部の炎症を抑えます。
1-メントール	20mg	清涼感を与え、患部のかゆみを緩和します。

添加物：モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、水酸化ナトリウム、塩酸

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)アルコール類、油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの(化学繊維、合成樹脂、家具、床等)への付着は避けてください。

みずむし治療のポイント

1. **清潔** 患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。
2. **乾燥** 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通しよく、よく乾燥。
3. **根気** 風呂あがりの薬剤治療、かゆくなくても1シーズン。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願い申し上げます。
新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号 076-472-0361
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1
受付時間 9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)