

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

水虫治療薬

リドマスタ-EX

製品の特徴

- 角質層に長く留まる性質のあるブテナフィン塩酸塩を配合し、1日1回で水虫・たむしに効果を発揮します。
- かゆみにクロタミトン、リドカイン、*dl*-カンフルが効果を発揮します。
- 炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合しています。

⚠️ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2)湿疹
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)乳幼児
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)患部が顔面又は広範囲の人
- (6)患部が化膿している人
- (7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、 落屑 <small>らくせつ</small> （フケ、アカのような皮膚のはがれ）、ただれ、 水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(必ず裏面もお読みください)

【効能・効果】 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】（1g中）

成分	分量	作用等
ブテナフィン塩酸塩	10mg	白癬菌を殺菌します。
クロタミトン	30mg	かゆみを特異的に抑えます。
リドカイン	20mg	かゆみをすばやく抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
dl-カンフル	10mg	清涼感を与え、かゆみを抑えます。

添加物：ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、塩酸

＜保管及び取扱い上の注意＞

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5)アルコール類、油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの（化学繊維、合成樹脂、家具、床等）への付着は避けてください。

みずむし治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類（靴下）もこまめに洗い清潔に。
2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良く、よく乾燥。
3. 根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願い申し上げます。受付時間9時～17時（土、日、祝日を除く）

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号(076)472-0361
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

発売元 **株式会社アルトルイズム**
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田ビル7F

製造販売元 **新生薬品株式会社**
富山県中新川郡上市町横越16番1