

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

みずむし・いんきんたむし・ぜにたむし

第2類医薬品

クロトリンゼリー

クロトリマゾール配合

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむしは、白癬菌というかびの一種が皮膚の角質層に寄生することによっておきる疾患です。かゆみ、痛みをとまなうことが多く湿潤、小水疱、ただれ、皮膚の剥離などの症状をしめします。高い温度と湿気とでむれたりしたとき症状が悪化する場合が多く治りにくい皮膚病です。クロトリンゼリーは白癬菌などの真菌に対し強い抗菌作用を有するクロトリマゾールに、抗炎症作用を有するグリチルレチン酸を配合したみずむし、たむしの薬です。

◆クロトリンゼリーの特長

- 主成分のクロトリマゾールは白癬菌に対して強い抗菌作用をもっています。
- 浸透力の良いゼリー剤で有効成分が溶解しています。
- 水溶性ですので、水で洗い流せます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (5) 患部が化膿している人。
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがかがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ

3. 2週間位使用しても症状がよならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量（100g中）

成 分	含量	はたらき
クロトリマゾール	1.00g	白癬菌を殺菌します。
グリチルレチン酸	0.50g	患部の炎症を改善します。

添加物としてカルボキシビニルポリマー、エタノール、プロピレングリコール、マクロゴール、トリスプロパノールアミン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有する。

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量


1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

※チューブ穴の開け方(右図を参照してください。)

キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当てます。



保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)アルコールなどにとけるおそれのあるもの(めがねのわく、塗装家具など)にはつかないようにしてください。
- (6)使用期限(外箱に表示)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

包装

18g

★水虫治療のポイント

白癬菌の寄生は、症状の現れている範囲より広がっていることが多いので、薬剤は広めに塗布しましょう。又、次のことに留意してください。

<p>①根気よく継続治療するかゆみがなくなっても、すっかり治るまで根気よく治療を続け再発を防ぎましょう。</p>	<p>②患部を乾燥させる 通気性の悪い靴下やゴム長靴は好ましくありません。 むれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。</p>
<p>③衣類も清潔にする 靴や靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔に保ち感染に注意しましょう。</p>	<p>④患部をよく洗って清潔にする 白癬菌増殖の抑制や二次感染を防ぐため患部をよく洗い清潔に保ちましょう。</p>

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

コーア製薬株式会社「お客様相談室」

電話 045-562-5871

時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

販売元 コーア製薬株式会社 横浜市港北区箕輪町 2-17-5

※ 製造販売元 日本ゼトック株式会社 東京都新宿区西新宿 1-26-2

CT-1