

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

みずむし・たむし用薬

新アウト軟膏 第2類医薬品

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむしは、かびの一種である白癬菌によっておきる皮膚病で、かゆみ、痛みを伴う場合が多く、発赤、湿潤、小水泡、ただれ、皮膚の剥離などの症状を示します。高い温度と湿気とで、または発汗と体温でむれたりしたときに症状が悪化する場合が多く、治りにくい皮膚病です。

新アウト軟膏は浸透力の良い基剤に抗白癬菌作用を有するトルナフテートと木槿皮チンキA、消炎作用を有するグリチルレチン酸を配合した軟膏です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないで下さい

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 乳幼児。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
 - (6) 患部が化膿している人。
 - (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日2～3回、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (5)本剤は外用にのみ使用して下さい。

成分・分量 100g中

成分	分量
トルナフテート	2.0g
グリチルレチン酸	0.2g
木槿皮チンキA	10.0g

添加物として、マクロゴール、BHTを含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、配置期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの配置販売業者又は下記までご連絡下さい。

日本ゼトック株式会社

電話 0120-886-440

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **日本ゼトック株式会社**
東京都新宿区西新宿1-26-2