

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

みずむし・たむしに1日1回

ミナテクトクリーム

第②類医薬品

〈特 長〉

- テルビナフィン塩酸塩の殺菌作用と角質浸透性により、1日1回の塗布で白癬菌を殺菌します。
- ジフェニヒドラミン塩酸塩がかゆみを鎮めます。
- グリチルレチン酸が炎症を抑えます。
- インプロピルメチルフェノールが患部の周りの雑菌の発生を抑えます。
- べたつかず、さらっとした使用感のクリームです。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠している可能性のある人。
- (3) 乳幼児。
- (4) 薬などによりアレルギーを起こしたことがある人。
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、 <small>りんせつ</small> 鱗屑・ <small>らくせつ</small> 落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、いたみ、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することがあります。

3. 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能・効果〉

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

〈用法・用量〉

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

1. 定められた用法を厳守してください。
2. 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
3. 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
4. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
5. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
6. 外用にのみ使用してください。

〈成分・分量〉（100g中）

成分	分量	はたらき
テルビナフィン塩酸塩	1.0g	みずむし・たむしの原因である白癬菌に優れた殺菌作用を示します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5g	患部のかゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	0.5g	患部の炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	患部の雑菌の発生を抑えます。

添加物として、ポリソルベート60、ソルビタン脂肪酸エステル、セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、ジイソプロパノールアミン、ハッカ油、その他5成分を含有します。

〈保管及び取り扱い上の注意〉

1. 直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
4. 使用期限（ケースに記載）をすぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

日本ゼトック株式会社 お客様相談窓口 ☎0120-886-440

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿 1-26-2