

使用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。  
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

第2類医薬品

水虫・たむし治療薬

# ヒフケス®

チアントール・レゾルシン配合



## 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

### 次の部位には使用しないこと

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が顔面又は広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

#### 3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能又は効果】

水虫、いんきんたむし（頑癬）、ぜにたむし（水疱性斑状白癬）、しらくも（頭部浅在性白癬）、ひぜん（疥癬）、とびひ、かゆみ（痒疹）、尋麻疹のかゆみ

## 【用法及び用量】

1日数回適量を患部によく塗擦する。

### ◎用法及び用量に関する注意

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)寄生性の皮膚病は、外見上よくなつたようでも、完全に治っていない場合がありますから、根気よく治療を続けること。
- (6)患部に水疱ができるいるようなときは、無理につぶさず、水疱の上からリント布かガーゼにうすくのばして貼ることをおすすめします。
- (7)入浴直後にお使い頂きますと、より効果的です。

## 【成分及び分量】

(100 g 中)

チアントール	.....	15.0 g	・ イオウ	.....	5.0 g
レゾルシン	.....	2.0 g	・ フェノール	.....	0.5 g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	.....	0.1 g	・ 酸化亜鉛	.....	10.0 g
ハッカ油	.....	0.5 g			

添加物としてトラガント末、安息香酸、香料、グリセリンを含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

---

## 消費者相談窓口

大和製薬株式会社

所在地 富山県富山市水橋二杉1-2

T E L 076 (478) 5171

受付日時 月~金曜日 AM10:00~PM 3:00  
(祝・祭日を除く)

---

製造販売元



大和製薬株式会社  
富山県富山市水橋二杉1-2