

使用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

第2類医薬品

みずむし・たむし治療薬

ヒフケス®U

かかとや足の裏の水虫に…尿素配合クリーム



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (5) 患部が化膿している人。
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ、水疱

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法及び用量】

適量をとり、1日1～3回患部に塗布する。

◎用法及び用量に関する注意

- (1) 定められた用法及び用量を厳守すること。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 外用にのみ使用すること。
- (6) 寄生性の皮膚病は、外見上よくなつたようでも、完全に治っていない場合がありますから、根気よく治療を続けること。
- (7) 患部に水疱ができているようなときは、無理につぶさず、水疱の上からリント布かガーゼにうすくのばして貼ることをおすすめします。
- (8) 入浴直後にお使い頂きますと、より効果的です。

【成分及び分量】

(100 g 中)

エコナゾール硝酸塩……………1.0 g · ベンゼトニウム塩化物……………0.1 g
クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.5 g · グリチルレチン酸……………0.5 g
尿素……………10.0 g

添加物としてスクワラン、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ラウリル硫酸ナトリウム、モノステアリン酸グリセリン、D-ソルビトール液を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

消費者相談窓口

大和製薬株式会社

所 在 地 名古屋市中区栄1丁目29番6号

T E L 052(202)0067

受付日時 月～金曜日 AM10:00～PM3:00

(祝・祭日を除く)

製造販売元



大和製薬株式会社

富山県富山市水橋二杉1-2