


ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

みずむし・たむし用薬 エフゲンクリーム



硬くなったかかと等のみずむしは、角質層が他の部分より厚く薬が浸透しにくくなっています。
エフゲンクリームは白癬菌に対して抗菌作用のあるウンデシレン酸と角質層を軟化させ、浸透性を高める尿素、サリチル酸を配合したみずむし・たむし用薬です。



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)乳幼児。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)患部が顔面又は広範囲の人。(6)患部が化膿している人。
(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

成分・分量

(100g中)

ウンデシレン酸…… 3.0g

サリチル酸…………… 4.0g

尿素……………10.0g

添加物として、セトステアリアルアルコール、ワセリン、スクワラン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、ポリソルベート60、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、グリセリン、プロピレングリコール、キサンタンガム、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、グリシン、香料を含量します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4)他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

消費者相談窓口

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記までお願いします。

足のマークの **大源製薬株式会社**

〒660-0085

尼崎市元浜町5丁目79番地

電話番号 06-6418-0278 フリーダイヤル 0120-184-364

受付時間 9:00~17:00 (土・日祝を除く) 時間外にもメールでのお問い合わせができます。

ホームページアドレス <http://www.e-daigen.co.jp> メールアドレス f-gen@e-daigen.co.jp

販売元

大源製薬株式会社

兵庫県尼崎市元浜町5丁目79番地

製造
販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142