

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

[みずむし・たむし用薬]

販売名 水虫薬エフゲン リキッドα

水虫・たむしは、白癬菌というカビが皮膚の角質層等に寄生して起こる皮膚病で、かゆみや痛みを伴うことが多くあります。水虫薬エフゲン リキッドαには6種類の有効成分を配合。1日1回の使用により、かゆみや痛みを伴う(水虫・たむしの)不快な症状を改善します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の人は使用しないでください。 ② 次の部位には使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

①目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。②湿疹。③湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

①医師の治療を受けている人。②妊婦又は妊娠していると思われる人。③乳幼児。④薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。⑤患部が顔面又は広範囲の人。⑥患部が化膿している人。⑦「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

* 全身に発現することもあります

- ③ 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に
関する注意

- ①定められた用法・用量を厳守してください。
- ②患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- ③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- ④小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ⑤外用にのみ使用してください。
- ⑥本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。

成分・分量(100g中)

成分	分量	はたらき
テルピナフィン塩酸塩	1.0g	白癬菌を殺菌します。
リドカイン	2.0g	患部のかゆみ・痛みを一時的に鎮めます。
グリチルレチン酸	0.5g	患部の炎症を改善します。
クロタミトン	5.0g	患部のかゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	患部を殺菌・消毒します。
l-メントール	2.0g	清涼感を与え、患部のかゆみをやわらげます。

添加物：エタノール、1, 3-ブチレンジングリコール、マクロゴール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

①直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)④火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。⑤揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。⑥メガネ、時計、アクセサリ等の貴金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。⑦使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

容器の使用方法

●使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)●使用するときは容器を downward または斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなりやす。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)

【使用前】



【使用中】



火気厳禁 第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ(エタノール)

容量：30mL

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記までお願いします。

電話番号 06-6418-0278 フリーダイヤル 0120-184-364 受付時間 9:00~17:00 (土・日祝を除く)

足のマークの大源製薬株式会社 ウェブサイト <http://www.e-daigen.co.jp> メール f-gen@e-daigen.co.jp

販売元

大源製薬株式会社 兵庫県尼崎市元浜町5丁目79番地

製造販売元

万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142