

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

【販売名】 ラウマー水虫液MC
(水虫・たむし用薬)

【成分・分量】(100mL中)
ミコナゾール硝酸塩 1.0g、クロタミトン 10.0g、リドカイン 2.0g、グリチルリチン酸二カリウム 0.5g、ト-メントール 1.0g
添加物：セパシン酸ジエチル、プロピレングリコール、エタノール

【効能・効果】
水虫、いんきんたむし、げにたむし

【用法・用量】
1日1~2回、適量を患部に塗布してください。

- (用法・用量に関連する注意)
- 1) 定められた用法・用量を厳守してください。
 - 2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
 - 3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
 - 4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - 5) 外用にのみ使用してください。

- 〈容器の使用法〉
- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の蓋を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)
 - 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)

△ 使用上の注意

- ⊗ してはいけないこと
- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 次の部位には使用しないでください
- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
 - (2) 湿疹。
 - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 乳幼児。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 陰のうにかゆみ又は広範囲の人。
 - (5) 患部が化膿している人。
 - (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、げにたむし」か「がはっりしない人」(陰のうにかゆみ又はただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、乾燥、つっぱり感、水疱、ヒリヒリ感
3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

セルフメディケーション
税 控除 対象
第2類医薬品

ラウマー水虫液MC

1日1~2回
かゆい

水虫
液

ピンポイントに
塗れる液体タイプ 30mL

殺真菌成分
ミコナゾール硝酸塩

Wのかゆみ止め
成分配合

クロタミトン・リドカイン

- 【保管及び取扱い上の注意】
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4) 火気に近づけないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (5) 本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具等に付着しないようにしてください。
 - (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

目には入れないこと

火気厳禁
第二石油類
(エタノール、プロピレングリコール)
水溶性 危険物等級Ⅲ

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社
「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

4 535653 002812

日本製
容量：30mL