

水虫・たむしに

9つの有効成分配合

ラウマーベンタム

第2類医薬品

30mL

水虫・たむしに

9つの有効成分配合

殺真菌

ブテナフイン塩酸塩

殺菌成分

抗炎症成分

かゆみ止め成分

清涼感成分



殺菌効果が1日持続

ラウマーベンタム

第2類医薬品

セルフレミング
セロトニン受容体拮抗剤

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5)火気には近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないうちください。
- (7)合成樹脂(ステロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具等につかないようにしてください。

目には入れないこと

火気厳禁
第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ
(エタノール)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発売元
日本邦薬品工業株式会社
東京都足立区足立木3丁目4番16号
<https://www.nippon-yakuhanin.jp/>

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0558-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)



4 976084 441380

日本製
容量: 30mL



A2505

上段は使用期限、
下段は製造番号です

1
M017

省資源化のため、箱に添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

【販売名】 ラウマーベンタム
(みずむし・たむし用薬)

【成分・分量】 (100g中)
ブテナフイン塩酸塩1.0g、イソプロピルメチルエチルオルゴノール0.3g、グローブフェニラミンマレイン酸塩0.5g、クロタミントン5.0g、リドカイン2.0g、アラントイン0.1g、グリチルレチン酸0.5g、dl-カンフル1.0g、l-メントール1.0g

添加物：1,3-ブチレングリコール、マクロゴル、リン酸、エタノール
(成分に関連する注意)

アルコールを含んでいますので、塗布時にしみことがあります。

【効能・効果】

みずむし・いんさんたむし・ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。
(用法・用量に関連する注意)

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(5)外用のみを使用してください。

【容器の使用法】

● 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押して中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)

● 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てる、容器底部を強く握ると薬液が多く出ます。)

△ 使用上の注意

【としてはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、喉等)、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。

(3)湿潤・ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師・薬剤師又は登録販売者が相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠婦又は妊娠していると思われる人。

(3)乳幼児。

(4)葉などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)患部が顔面又は広範囲の人。(6)患部が化膿している人。

(7)「湿疹」か「みずむし・いんさんたむし・ぜにたむし」かがはつきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者が相談してください。

【関係部位 症状】

| |
|--|
| 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、敏感、落屑、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂 |
| 皮膚 |

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者が相談してください。