ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈みずむし・たむし用薬〉

# リドマスターDX

第②類医薬品

みずむし・たむしは、白癬菌というカビが皮膚の角質等に寄生して起こる病気で、痒みや痛みを伴うことがあります。白癬菌は足裏や爪周りにも潜むことがあります。リドマスターDXには9種類の有効成分を配合しており、1日1回の使用により、白癬菌を殺菌し、かゆみや痛みを伴うみずむし・たむしの不快な症状を改善します。足裏のガサガサ水虫、かかと水虫や見た目の気になる爪周りや爪際の水虫も治療します。

# $\Lambda$

## 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1. 次の人は使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないでください
  - (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。 (2)湿疹。



### 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)乳幼児。
  - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5)患部が顔面又は広範囲の人。
  - (6) 患部が化膿している人。
  - (7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。 (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症    状	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感 屑、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂	、落

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

#### 【用法・用量】

1日1回、適量を患部に途布してください。

#### (用法・用量に関連する注意)

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水 又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

#### 【成分・分量】100g中に次の成分を含みます。

成力·力量』100g TVE (((V))成力を目がより。					
成分名	分量	作用			
ブテナフィン塩酸塩	1.0g	皮膚の角質に浸透し、白癬菌が生きていくために必要な細 胞膜に働きかけて殺菌作用を発揮します。			
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えます。			
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5g	かゆみや炎症を抑えます。			
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用で、かゆみを一時的に抑えます。			
クロタミトン	5.0g	患部のかゆみを一時的に鎮めます。			
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	皮膚表面を殺菌し、二次感染を予防します。			
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。			
1-メントール	2.0g	個体心とすん、ダツタクを誤めまり。			
アラントイン	0.1g	傷んだ皮膚の修復を促します。			

添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、パラベン、BHT、ジメチルポリシロキサン、酒石酸を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5)チューブの口に穴を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る 場合がありますのでご注意ください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、 開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

#### 水虫治療のポイント

- ○患部はいつも清潔にしましょう。靴下や靴等も清潔なものを使用しましょう。
- ○白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いため、 薬剤は広めに塗布しましょう。
- ○かゆみ等がなくなっても、再発することがあるためしばらくの間は根気よく治療を続けましょう。
- ○患部のむれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。

本品についてのお問い合わせは お買い求めのお店又は下記にお願い致します。 〈商品販売に関するお問合せ〉 健幸くすり堂

電話 0570-092-900

(受付時間 平日9:00~18:00)

発 売 元

株式会社アルトルイズム 福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5 鶴田ビル7F 製造販売元

万協製薬株式会社