

第②類医薬品

水虫薬

ミズムクリアEX

テルビナフィン塩酸塩配合



管理コード
512105A0

ミズムクリアEXは水虫の原因の白癬菌を殺菌するテルビナフィン塩酸塩を配合する水虫治療薬です。

〔特 徴〕

- テルビナフィン塩酸塩の優れた殺真菌作用と角質層への浸透力により1日1回の塗布で、薬剤が患部に留まって水虫に持続的に効果を発揮し、症状を治していきます。
- イソプロピルメチルフェノールが患部周辺の雑菌の繁殖を抑えます。
- 乾きやすく、サラッとした使用感の液剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

(1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等

(2)湿疹

(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)乳幼児

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5)患部が顔面又は広範囲の人

(6)患部が化膿している人

(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑（フケ・アカのような皮ふのはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂、いたみ、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することがあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

〔用法・用量〕

1日1回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>


1. 定められた用法を厳守してください。
2. 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
5. 外用にのみ使用してください。
6. 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

<ミズムクリアEXご使用方法>

■ご使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。※空気を抜かないと薬剤が勢いよく出てくる場合があります。



・使用するときは、容器を下向きにし、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。※先端を患部から離すと、薬液は出なくなります。
・塗布部分を清潔にし、水分をしっかり拭き取ったあとにご使用ください。皮ふが柔らかくなっている入浴後がおすすめです。
・適量を吐出し、爪と皮ふの間を中心に、足の指すべてに薬剤をなじませてください。片足につき12～14プッシュを目安に使用し、症状のある部分だけでなく、両足の指全体に塗布してください。



<水虫治療のポイント>

1. **根気よく治療を続けましょう。**
症状が治まったあとでも約1ヵ月程度は塗布してください。
2. **患部はいつも清潔にしましょう。**
菌の増殖を抑え二次感染を防ぐため、患部は丁寧に洗って清潔にしてください。
3. **患部は乾燥させましょう。**
入浴後や汗をかいたあとはしっかりと乾燥させてください。通気性の悪い靴や靴下はなるべく避け、患部を乾燥させるように心がけてください。

〔成分・分量〕

成分	分量 (1g中)	はたらき
テルビナフィン塩酸塩	10mg	水虫・たむしの原因の白癬菌に殺菌作用を示します
ジフェンヒドラミン塩酸塩	5mg	患部のかゆみを抑えます
グリチルレチン酸	5mg	患部の炎症を抑えます
イソプロピルメチルフェノール	3mg	患部周辺の雑菌の繁殖を抑えます

添加物：プロピレングリコール、ベンジルアルコール、エタノール、クエン酸水和物

〔保管及び取り扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
5. 火気に近づけないでください。
6. 本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化したり塗料をとくしたりすることがあるので、床や家具等につかないようにしてください。

製品についてのお問合わせ

株式会社北の達人コーポレーション
電話：0570-55-0717
(10:00～12:30 / 13:30～17:00) ※土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

〔発売元〕

株式会社北の達人コーポレーション
北海道札幌市中央区北1条西1-6 さっぽろ創世スクエア25F

〔製造販売元〕

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168