

第2類医薬品

クリームの水虫・たむし用薬

皮膚薬 **E I F**[®]
Eifu

〈皮膚薬エイフ〉は、芳香のある白色清浄な軟膏で、抗菌作用と角質を軟化する作用があります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (5) 患部が化膿している人。
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】

1日2～3回直接患部に塗擦するかガーゼ等にのぼして貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

サリチル酸	15.0%	その他、添加物として、
ℓ-メントール	0.2%	ステアリン酸、白色ワセリン
龍 脳	5.0%	及びタルクを含有する。

【治療上の心得】

- 患部はときどき湯又は清水に浸したガーゼ等で拭い、乾いた後、薬を塗擦してください。
- 患部は痒くても決して爪で搔いてはいけません。手袋などして、睡眠中にも患部を掻きこわさないように注意してください。
- 皮膚の弱い方、子供の顔などへ多量の塗擦はさけてください。
- 靴下や下着はなるべく木綿製のものを用い、毎日とりかえて常に患部を清潔に保つように心がけましょう。
- みずむし、たむしには症状のよく似ている別の皮膚病がありますので、専門家へのご相談が大切です。

なお、エイフは患部の皮膚を軟化する角質軟化剤サリチル酸が配合してありますので、入浴後ひじ、くるぶし、かかと等に塗擦しておきますと、老化して硬く荒れた皮膚もなめらかになります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元：松田薬品工業株式会社

愛媛県松山市河野中須賀318
電話 (089)994-1333

〔受付時間 8:30～17:00〕
〔土、日、祝日を除く〕