

第2類医薬品

みずむし・たむし用薬

ホーカー軟膏

特徴

水虫は、カビの一種である白癬菌が皮膚の一番上層の角質層に住みつくとで起こります。

ホーカー軟膏は、有効成分のはたらきにより白癬菌を殺菌し、不快な水虫のかゆみを改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください


- (1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (5) 患部が化膿している人。
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

普通1日1～2回、患部に塗布してください。

症状に応じ1日数回、患部に塗布していただいても差し支えありません。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

成分・分量 100g中

タウリン(アミノエチルスルホン酸) ……………10g
クロルヘキシジン塩酸塩 ……………0.2g
ウンデシレン酸亜鉛 ……………5g
イオウ ……………10g
d-カンフル ……………3.2g
l-メントール ……………1.6g
添加物：ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

みずむし・たむし治療に際しての注意

- 患部は常に清潔にしてください。水虫の治療と予防には、清潔が第一です。入浴時には、患部を石けんでよく洗い清潔を保ちましょう。
- 白癬菌は、じめじめした環境を好みます。スポーツ等で汗をかいた後や入浴の後には、患部を十分に乾かしてください。また、通気性の良い靴下・靴を着用することも大切です。
- かゆみ等の症状がとれても白癬菌の一部が生きていて、途中で治療を中止してしまうと再発の原因になります。かゆみ等がとれた後もしばらくの間根気よく治療を続けてください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2