

開け口

マイルゾンBT液

(水虫・たむし用薬)

商品詳細へ



第②類医薬品

30mL

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

成分・分量 <100mL中>

ブテナフィン塩酸塩 1.0g、リドカイン[®] 2.0g、グリチルリチン酸 0.5g、クロルフェナミンマレイン酸塩[®] 0.5g、*dl*-カンフル[®] 1.0g、*l*-メントール[®] 1.0g、クロタミン[®] 5.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.3g

添加物：プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、リン酸、クエン酸ナトリウム水和物、エタノール 含有

※かゆみ止め成分

〈成分に関連する注意〉

アルコールを含んでいるので、塗布時にしみることがあります。

〈水虫治療のポイント〉

○患部を清潔にしましょう。靴下や靴等も清潔なものを使用しましょう。○水虫菌(白癬菌)は、症状のある範囲より広がっていることが多いため、薬剤は広めに塗布しましょう。○かゆみ等がなくなっても、完治していない場合がありますので、最低1ヵ月程度は塗り続けましょう。○ふだんから患部がむれやすいように十分に乾燥させましょう。

製造販売元 株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎1020-149-931

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
水溶性
エタノール含有物 30mL



ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰部、外陰部、陰茎
- (2) 湿疹(3) 潰瘍、ただれ、亀裂や外傷のひびき患部



△ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 乳幼児(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 患部が顔面又は広範囲の人
(6) 患部が化膿している人
(7) 「湿疹」「かゆみ」「いんきんたむし」「ぜにたむし」かかはっきりしない人(陰部のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑(フケ、アカ)のような皮膚のはがれ、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


患部がカサカサした
水虫などに

マイルゾン[®]
BT液

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

＜容器の使用方法＞



●使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。(暑い時期には内圧が高まり、薬液が多くなることがありますので、これを防ぐためです。)●患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあてて塗布してください。(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなります。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり、品質が変わります。)
- (4) 火気になつげたり、火の中に入れたりしないでください。
- (5) 使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (6) 合成樹脂(プラスチック等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、バツヤや床、家具などにつかないようにしてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

殺真菌成分

(ブテナフィン塩酸塩)

＋かゆみ止め成分

1日1回



[液剤] 30mL

セルフメディケーション

税 控除 対象



富士薬品

第②類医薬品