

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

みずむし・たむし用薬 アウトCゼリー

第2類医薬品

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむしは、白癬菌というかびの一種が皮膚の角質層に寄生することによっておきる疾患です。かゆみ、痛みをともなうことが多く湿潤、小水疱、ただれ、皮膚の剥離などの症状をしめします。

高い温度と湿気とでむれたりしたとき症状が悪化する場合が多く治りにくい皮膚病です。アウトCゼリーは白癬菌などの真菌に対し強い抗菌作用を有するクロトリマゾールに、抗炎症作用を有するグリチルレチン酸を配合したみずむし、たむしの薬です。

〈特 長〉

- 主成分のクロトリマゾールは白癬菌に対して強い抗菌作用をもっています。
- 浸透力の良いゼリー剤で有効成分が溶解しています。
- 水溶性ですので、水で洗い流せます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

- 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、瞼等）、陰のう、外陰部等。
- 湿疹。
- 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 医師の治療を受けている人。
- 乳幼児。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 患部が顔面または広範囲の人。
- 患部が化膿している人。
- 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〈効能・効果〉

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

〈用法・用量〉

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。なお、症状により適宜増減する。

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

〈成分・分量〉 (100g中)

成 分	含量	はたらき
クロトリマゾール	1.00 g	白癬菌を殺菌します。
グリチルレチン酸	0.50 g	患部の炎症を改善します。

添加物として、エタノール、プロピレングリコール、マクロゴール、トリイソプロパノールアミン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、その他1成分を含有します。

〈保管及び取扱上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) アルコールなどにとけるおそれのあるもの(めがねのわく、塗装家具など)にはつかないようにすること。
- (5) 配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、配置期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること。

〈水虫治療のポイント〉

白癬菌の寄生は、症状の現れている範囲より広がっている場合が多いので、薬剤は広めに塗布しましょう。又、次のことに留意してください。

①根気よく継続治療する かゆみがなくなつても、 すっかり治るまで根気 よく治療を続け再発を 防ぎましょう。		②患部を乾燥させる 通気性の悪い靴下やゴム長靴は好ましくありません。 むれを防ぎ、乾燥に心掛けましょう。	
③衣類も清潔にする 靴や靴下、スリッパ、 浴室のマットも清潔に 保ち感染に注意しまし ょう。		④患部をよく洗って清潔にする 白癬菌増殖の抑制や二次感染を防ぐため患部をよく洗い清潔に保ちましょう。	

本品についてのお問い合わせは配置販売業者又は下記にお願い致します。
日本ゼトック株式会社

電話番号 0120-886-440

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00

(ただし、土、日、祝日を除きます。)

製造販売元

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿1-26-2