

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

みずむし・たむし用薬

ピロエース[®] EX 液

ピロエースEX液の特徴

- 殺真菌成分「ラノコナゾール」が、患部によく浸透し、角質が厚くなってしまったみずむしにも効果を発揮します。長時間患部に貯留し、1日1回の使用で効果をあらわします。
- 「クロルフェニラミンマレイン酸塩」「クロタミトン」が、患部の不快なかゆみをしずめます。
- 「L-メントール」が、患部にスッとした清涼感を与え、かゆみをしずめます。
- 「グリチルレチン酸」が、患部の炎症をおさえます。
- カサカサタイプの症状に塗りやすく、使いやすい液剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないで下さい。
 - 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、瞼等)、陰のう、外陰部等
 - しつしん
 - 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 乳幼児
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が顔面又は広範囲の人
 - 患部が化膿している人
 - 「しつしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しつしん等他の原因による場合が多い)
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱、ヒリヒリ感、亀裂

なお、「むくみ、息苦しさ」があらわれた場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

- 使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が前より広がる等)は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

使用法

1日1回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関する注意〉


- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (5) 外用にのみ使用して下さい。

患部をよく洗ってから患部より広めに薬剤を塗布して下さい。菌の増殖や二次感染を防ぐため患部を清潔に保ちましょう。足は不潔になりやすいので特に清潔にして下さい。また、再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからも2~4週間は治療を続けることが大切です。

プッシュ式容器の使い方

使用前

温度の高い場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合、容器の中の圧力が高くなり薬液が多く出ることがありますので、使用前に容器の先端を上に向けて、手の指で先端部分を押して中の空気を抜いて下さい。




使用中

使用する際は、容器の先端を下に向け、患部に軽く押しあてて塗布して下さい。先端を押したままにする、薬液が出続けますので注意して下さい。



はなす (薬液が止まる)



成 分・分 量

本剤は無色透明な液で、100mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量
ラノコナゾール	1.0g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5g
クロタミトン	5.0g
グリチルレチン酸	0.5g
I-メントール	1.0g

添加物:マクロゴール、アジピン酸ジイソプロピル、pH調節剤、エタノール

〈成分・分量に関する注意〉

- (1) 本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。
- (2) 塗布後ほてり(熱感)を感じることがありますが、短時間のうちに消失します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

01®登録商標



製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋 3-14-10