



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

2012年9月 記載要領変更に伴う改訂

**第3類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ず
お読みください。また、必要な時読める
よう大切に保管してください。



尿素20% 乾燥性皮膚治療薬 パスタロン[®]M20%

手指をすべすべに・かかとをなめらかに

パスタロンM20%は…

- 尿素20%(保湿成分)に血流を促進するトコフェロール酢酸エステルと炎症を鎮めるグリチルリチン酸二カリウムの配合により保湿力を高めました。
- 基剤を改良し、べたつきを抑えた使用感のよいクリームです。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 傷口又は赤く腫れている患部。
2. 使用後は長時間直射日光に当たらないでください



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤、ただれやヒビ割れのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたのように皮膚がはがれる状態等

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】

- 手足のあれ
- かかと・くるぶし・ひざ・ひじの角化症
- 老人の乾皮症
- さめ肌

★裏面につづく

〔用法・用量〕

1日数回、患部を清浄にした後、塗布し、よくすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕100g中

成分	分量	働き
尿素	20g	角質における水分保持作用により、お肌にうるおいを与え、手足のあれ、角化症に効果をあらわします。
グリチルリチン酸 二カリウム	0.5g	あれたお肌の炎症を鎮めます。
トコフェロール 酢酸エステル	0.5g	血流を促進し、皮膚の新陳代謝を高めることにより、手足のあれ、角化症に効果をあらわします。

添加物として、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、ジメチルポリシロキサン、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、トリイソオクタン酸グリセリン、セタノール、ステアリン酸、グリセリン、パラベン、エデト酸Na、乳酸、水酸化Na、グリシンを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎ご使用に際してのアドバイス

患部をきれいにし、1日数回塗布し、よくすり込んでください。特に水仕事のあと、長時間乾燥した空気にお肌をさらしたとき、お風呂あがり、おやすみ前に塗っていただくと効果的です。

お肌の水分が少なくなると…

- 手がザラザラしてあれてくる。
- かかと・ひざ・ひじなどが固くゴワゴワになる。
- お子様やお年寄りの方のお肌がカサカサしてかゆくなる。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号