

## 生薬製剤

ヨクイニンセン

# 薏苡仁煎エキス錠

薏苡仁煎はいぼや肌あれ、関節痛などを改善します。炎症を鎮め、余分な水分を尿として体外へ排出し、水分の代謝を調整する働きがあります。

本剤は薏苡仁と甘草の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい錠剤としました。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

いぼ、皮膚のアレ、利尿、関節痛

### 用法・用量

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 3錠      | 3回     |
| 7才以上15才未満 | 2錠      |        |
| 7才未満      | 服用しないこと |        |

食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

食間とは…食後2～3時間を指します。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量 9錠中

薏苡仁煎乾燥エキス0.84 gを含有しています。

| 成分      | 含量      | 成分     | 含量      |
|---------|---------|--------|---------|
| 日局ヨクイニン | 5.250 g | 日局カンゾウ | 0.525 g |

上記生薬量に相当します

添加物として、二酸化ケイ素、ヒドロタルサイト、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

☎ 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)


電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

## 第3類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

生薬製剤  
 薏苡仁煎エキス錠

薏苡仁煎はいぼや肌あれ、関節痛などを改善します。炎症を鎮め、余分な水分を尿として体外へ排出し、水分の代謝を調整する働きがあります。

本剤は薏苡仁と甘草の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい錠剤としました。

 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

いぼ、皮膚のアレ、利尿、関節痛

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

| 年 齢        | 1 回量    | 1 日服用回数 |
|------------|---------|---------|
| 成人（15才以上）  | 3 錠     | 3 回     |
| 7 才以上15才未満 | 2 錠     |         |
| 7 才未満      | 服用しないこと |         |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 食間とは食後2～3時間を指します。

## 〔成分・分量〕

9錠中

薏苡仁煎乾燥エキス0.84gを含有しています。

〔 日局ヨクイニン…………… 5.250 g      日局カンゾウ…………… 0.525 g 〕  
 上記生薬量に相当します

添加物として、二酸化ケイ素、ヒドロタルサイト、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なる場合がありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。  
**ジェーピーエス製薬 お客様相談室**  
電 話 045-593-2136  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



### ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22