

2008年8月作成

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

管理番号
0808

販売名 デルコ S

第2類医薬品

本品は、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した絆創膏タイプの角質剥離剤です。厚く堅くなった皮膚をやわらかくし、うおの目、たこ、いぼを取り去ります。又、保護用パッドにより患部を守り、外部からの刺激による痛みをやわらげます。

うおの目、たこ、いぼとは

	症 状	形状(断面)	治った状態
うおの目	多くは足の裏にでき小豆ぐらいの大きさで中心に白い目があります。肥厚した角質が、くさび状に真皮に向かって入り込むため、大きくなると圧迫により強い痛みを感じます。		中心にある白い目(しん)が完全に取れた時
たこ	足底や手の平に好発し、繰り返し圧迫や摩擦等の物理的刺激により皮膚の角質が隆起したものです。表面はなめらかか、多少ざらざらしている程度です。押しても痛みがありません。		隆起した部分が取れた時
いぼ	ウイルス（ヒト乳頭腫ウイルス）の感染によって起こる皮膚の部分的変化です。体のどこにでもできますが、主に手や足の甲、手足の指、膝頭などに好発します。半球状で表面がざらざらしていて、しばしば群がって生じます。		隆起した部分が取れた時

⚠ [使用上の注意]

✗ [してはいけないこと]

(守らないと現状の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜、やわらかい皮膚面(首のまわりなど)、顔面等。
 - 炎症又は傷のある患部。
- 本剤は外用のみに使用し、内服しないでください。




[相談すること]

- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 乳幼児
 - 本人又は家族がアレルギー体质の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本品を続けて1週間程度使用しても症状の改善が見られない場合。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書及び箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

[効能及び効果] うおの目、たこ、いぽ

[形状]



[用法及び用量]

被覆してある剥離紙をはぎとり、中央部のサリチル酸絆創膏が患部を覆うように貼りつけてください。

● 1日ごとに交換してください。

特に、ご入浴後の使用は、よりいっそう効果的です。

● 交換の際には白くなった角質部を消毒したピンセットなどで取り除き、引き続き完全に取り切るまで本品の使用を繰り返してください。特に、うおの目はまん中の堅くなった角質の「しん」を完全に取り除かないと再発します。

[用法・用量に関する注意]

(1) 定められた用法を守ってください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(4) 外用のみ使用してください。

(5) 患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。

(6) 入浴時には必ず取りはずしてください。

[有効成分及び分量]

膏体100g(1000cm²)中、サリチル酸50gを含む。

添加物として精製ラノリン、ロジンエステルその他2成分を含む。

保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器(袋)に入れかえないでください。

*本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

製造販売元 阿蘇製薬株式会社

〒869-1101熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1

お客様相談窓口 096-232-3933

9:00~17:00まで(土・日・祝日を除く)