
使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

皮ふ軟化薬 Medicine for Keratosis

特徴

1. 4つの有効成分のはたらきで、黒ずんだひじ・ひざのザラザラを改善する塗り薬です
2. 硬く黒ずんだ角質は外部刺激などの炎症が原因の一つ。抗炎症成分で肌の炎症を鎮めます
3. 「尿素」が黒ずんだ角質を取り除きます
4. 代謝促進成分と保湿成分により、皮ふの生まれ変わりを促して、なめらかできれいな素肌に改善していきます

有効成分による角質変化



いつものお手入れの時にお使いください。継続してご使用いただくことで、実感しやすくなります。使用上の注意をよく読みご使用ください。※効果の感じ方には個人差があります。

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

効能・効果 ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指のあれ、さめ肌、老人の乾皮症

成分・分量 100g中 尿素 20.0g、グリチルリチン酸一アンモニウム 0.5g、トコフェロール酢酸エステル 2.0g、ガンマ-オリザノール 1.0g 添加物として、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸グリセリン、キサンタンガム、グリシン、エデト酸Na、BHT、パラベン、2，2'，2"-ニトリロトリエタノール、pH調節剤、香料を含有する

あったらいいな／をカタチにする
発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北4丁目6番16号

用法・用量 1日数回、適量を患部にすりこんでください ＜用法・用量に関連する注意＞（1）用法・用量を厳守すること（2）目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること（3）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること（4）外用にのみ使用すること（5）化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないこと

保管及び取扱い上の注意 （1）本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと（2）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること（3）小児の手の届かない所に保管すること（4）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）●衣類に付着すると、まれに黄ばみを生じることがあるため注意すること

使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないこと（1）目の周囲、粘膜等（2）引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位（3）かさぶたの様に皮ふがはがれている所（4）炎症部位（ただれ・赤く腫れている所）

相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（1）医師の治療を受けている人（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

押して開ける

黒ずんだひじ・ひざザラザラ治療薬
クロキュアEX
第3類医薬品

クロキュアEX
第3類医薬品

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

紙：箱　プラ：チューブ　キャップ

MADE IN JAPAN 10232439

使用期限
（西暦年.月）

製造番号