

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

皮膚軟化治療薬

第3類医薬品

デプリセールクリームEX

尿素20%配合クリーム剤

乾燥した皮膚、ザラザラした肌、カサカサしたひじ・ひざ・くるぶし・かかとは角質層の水分が不足しているのが原因です。健康な皮膚では、皮膚中の水分がちょうどよい量を保っていますが、不足するとあれて皮膚が硬くなり、カサカサ・ザラザラの肌になってしまいます。

尿素は角質層の水分を保持する作用があり、硬くなった角質を改善し、正常な皮膚に戻します。さらに、グリチルリチン酸二カリウムは患部の炎症を抑え、トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）は末梢循環を改善して組織の修復を早めます。

カサカサ・ザラザラした皮膚をしっとりなめらかにする**デプリセールクリームEX**でお早めのお手入れをしてください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)引っかき傷等のきすぐち、亀裂（ひび割れ）部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位（ただれ・赤くはれているところ）。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面もご覧ください)

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に擦り込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)15才未満の小児は使用しないでください。
- (2)定められた用法・用量を守ってください。
- (3)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)化粧品ではないので、効能で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

【効 能】

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【成分・分量とはたらき】 1g中

成 分	分量	は た ら き
尿 素	200mg (20.0%)	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮膚にしっとり感を与えます。また、乾燥してカサカサになった角質層表面をなめらかにします。
グリチルリチン酸 二カリウム	5mg	患部の炎症を抑えます。
トコフェロール酢酸 エステル (ビタミンE)	5mg	末梢の血行を促して、皮膚表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮膚表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮膚が生まれます。

添加物：流動パラフィン、プロピレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ステアリン酸、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、セタノール、スクワラン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、L-アルギニン、クエン酸水和物、ヒアルロン酸Na

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電 話：058-278-3933
受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地