

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 絆創膏タイプ 角質剥離剤

販売名

# ウォノメバンF

第2類医薬品

本品は、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した絆創膏タイプの角質剥離剤です。厚く硬くなった皮膚をやわらかくする（白くなる）ことで、うおの目、たこを取り去りやすくなります。又、保護用パッドにより患部を守り、外部からの刺激による痛みをやわらげます。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

### 次の部位には使用しないでください。

- 1.目の周囲、粘膜、やわらかい皮ふ面(首のまわり等)、顔面等
- 2.炎症又は傷、化膿のある患部等
- 3.群生したいば、身体に多発したいば
- 4.みずいば
- 5.湿ったいば
- 6.外陰部や肛門周囲にできたぶよぶよしたいば
- 7.褐色か淡黒色の扁平に隆起した老人性いば
- 8.かきキズにそって一列にできた若年性扁平いば

### 【相談すること】

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)乳幼児
  - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)本品を続けて1週間程度使用しても症状の改善が見られない場合

(5)化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

- (6)妊娠又は妊娠していると思われる人  
(サリチル酸の内服による動物実験で、胎児の奇形を起こす作用が報告されています)
- (7)糖尿病の治療を受けている人  
(糖尿病患者は感染抵抗力が低下しています。角質を取る際に皮ふを傷つけてしまった場合、感染しやすくなります)

- 2.本品をいばにご使用の場合、本品が有効なのは、角質化された表面のざらざらした硬いいばです。他のいばについては専門医に相談してください。
- 3.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

#### (2)本品を長期間使用しても症状の改善が見られない場合


## 【効能及び効果】 うおの目、たこ、いぼ

## 【用法及び用量】

1.患部の大きさに適合した保護用フェルトリング（粘着剤付き）をお選びください。

2.フェルトリングを台紙からとり、図のように患部のみがフェルトリングの孔から露出するように当ててください。  


3.次にサリチル酸紺創膏を患部の大きさに合わせて裁断し、患部を覆うように貼付してください。  


4.最後にプラスチック紺創膏でフェルトリングおよびサリチル酸紺創膏を固定してください。  


●1日毎に交換してください。特に、ご入浴後の使用は、よりいっそう効果的です。

●交換の際には白くなった角質部を消毒したピンセットなどで取り除き、引き続き完全に取り切るまで本品の使用を繰り返してください。特に、うおの目はまん中の堅くなった角質の「しん」を完全に取り除かないと再発します。

## 【用法・用量に関する注意】

(1)定められた用法を守ってください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で

洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(4)外用のみ使用してください。

(5)患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。

(6)入浴時には必ず取りはずしてください。

## 【容量】

●日本薬局方サリチル酸紺創膏(40mm×60mm)…2枚

●固定用粘着テープM(14mm×70mm)L(20mm×70mm)…各12枚

●フェルトリングS(内径6mm外形14mm)…4個

フェルトリングM(内径8mm外形16mm)…10個

フェルトリングL(内径10mm外形18mm)…6個

フェルトリングLL(内径14mm外形22mm)…4個

※SはLLの内側にセットされております。別々にご使用ください。

## 【有効成分及び分量】

膏体100 g (1000cm<sup>3</sup>)中、サリチル酸50 g を含む。

添加物として精製ラノリン、ロジンエステルその他2成分を含む。

## 【保管及び取扱上の注意】

1.直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

2.小児の手の届かない所に保管してください。

3.誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器(袋)に入れかえないでください。

※本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

製造販売元 阿蘇製薬株式会社

T869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1

お客様相談窓口 096-232-3933  
9:00～17:00まで(土・日・祝日を除く)

2012年10月改訂  
(第2版)

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 絆創膏タイプ 角質剥離剤

販売名 ウオノメバンF

第2類医薬品

本品は、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した絆創膏タイプの角質剥離剤です。厚く硬くなった皮膚をやわらかくする（白くなる）ことで、うおの目、たこを取り去りやすくなります。又、保護用パッドにより患部を守り、外部からの刺激による痛みをやわらげます。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⓧ【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

**次の部位には使用しないでください。**

- 1.目の周囲、粘膜、やわらかい皮ふ面(首のまわり等)、顔面等
- 2.炎症又は傷、化膿のある患部等
- 3.群生したいば、身体に多発したいば
- 4.みずいば
- 5.湿ったいば
- 6.外陰部や肛門周囲にできたぶよぶよしたいば
- 7.褐色か淡黒色の扁平に隆起した老人性いば
- 8.かきキズにそって一列にできた若年性扁平いば

#### 【相談すること】

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)乳幼児
  - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)本品を続けて1週間程度使用しても症状の改善が見られない場合

(5)化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

(6)妊娠又は妊娠していると思われる人  
(サリチル酸の内服による動物実験で、胎児の奇形を起こす作用が報告されています)

(7)糖尿病の治療を受けている人  
(糖尿病患者は感染抵抗力が低下しています。角質を取る際に皮ふを傷つけてしまった場合、感染しやすくなります)

2.本品をいばにご使用の場合、本品が有効なのは、角質化された表面のざらざらした硬いいばです。他のいばについては専門医に相談してください。

3.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2)本品を長期間使用しても症状の改善が見られない場合

**【効能及び効果】** うおの目、たこ、いぼ

## 【用法及び用量】

1.患部の大きさに適合した保護用フェルトリング（粘着剤付き）をお選びください。

2.フェルトリングを台紙からとり、図のように患部のみがフェルトリングの孔から露出するように当ててください。



3.次にサリチル酸紺創膏を患部の大きさに合わせて裁断し、患部を覆うように貼付してください。



4.最後にプラスチック紺創膏でフェルトリングおよびサリチル酸紺創膏を固定してください。



●1日毎に交換してください。特に、ご入浴後の使用は、よりいっそう効果的です。

●交換の際には白くなった角質部を消毒したピンセットなどで取り除き、引き続き完全に取り切るまで本品の使用を繰り返してください。特に、うおの目はまん中の堅くなった角質の「しん」を完全に取り除かないと再発します。

## 【用法・用量に関する注意】

(1)定められた用法を守ってください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で

洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(4)外用のみ使用してください。

(5)患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。

(6)入浴時には必ず取りはずしてください。

## 【容量】

●日本薬局方サリチル酸紺創膏(40mm×60mm)…3枚

●固定用粘着テープM(14mm×70mm)L(20mm×70mm)…各12枚

●フェルトリングS(内径6mm外形14mm)…4個

フェルトリングM(内径8mm外形16mm)…10個

フェルトリングL(内径10mm外形18mm)…6個

フェルトリングLL(内径14mm外形22mm)…4個

※SはLLの内側にセットされております。別々にご使用ください。

## 【有効成分及び分量】

膏体100 g (1000cm<sup>3</sup>)中、サリチル酸50 g を含む。

添加物として精製ラノリン、ロジンエステルその他2成分を含む。

## 【保管及び取扱上の注意】

1.直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

2.小児の手の届かない所に保管してください。

3.誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器(袋)に入れかえないでください。

※本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

製造販売元 阿蘇製薬株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1

お客様相談窓口 096-232-3933  
9:00～17:00まで(土・日・祝日を除く)

2012年6月改訂  
(第2版)