

ここから
開けてください

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状
(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたこと
がある人

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等
- (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
- (3)かさぶたのように皮ふがはがれている所
- (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売 者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆ
み、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の 可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説 明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に ご相談ください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱 感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのよ うに皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使 用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師ま たは登録販売者にご相談ください

【効 能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用 法】

1日1~数回、適量を患部に塗布してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目
に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で
洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼
科医の診療を受けてください

(2)小児(15歳未満)には使用させないでください
(3)外用にのみ使用してください

※この商品は(株)マツモトキヨシホール
ディングスのオリジナル商品です。

こんな方におすすめ

- かさつく肌をなめらかにしたい方
- 乾燥によるかゆみを止めたいた方

5つの有効成分配合

かゆみ止め成分 ジフェンヒドラミン

かゆみ止め成分 リドカイン

消炎成分 グリチルレチン酸


血行促進成分 トコフェロール
酢酸エステル

保湿成分 尿素20%

2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



皮ふやわらか成分(尿素)などが
うるおいのあるお肌にします



発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

matsu
kiyo

120g
1日1回~数回

2つのかゆみ止め成分配合
ウレパス20DXローション

乾燥肌による かゆみに 効く!

うるおい
保湿成分
尿素20%

薬のはたらき

かゆみを止める

カサカサ肌を潤いお肌に

尿素：20g
・皮ふをしっとり軟らかく
します

リドカイン：2g
・かゆみの伝達をブロッ
クして抑えます

ジフェンヒドラミン：1g
・かゆみの元ヒスタミン
を抑えます

グリチルレチン酸：0.3g
・皮ふの荒れを抑えます

トコフェロール酢酸
エステル：0.5g
・皮ふの血行をよくします

100g中

広い範囲の
乾燥肌に



硬くなった
ひじ・ひざ
かかと
くるぶしに



【成分】100g中

尿素……………20g
 リドカイン……………2g
 ジフェンヒドラミン……………1g
 グリチルレチン酸……………0.3g
 トコフェロール酢酸エステル…0.5g
 添加物：DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エドト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、 β -メントール、香料

【保管および取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)キャップの閉め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造
番号

使用
期限

乾燥性皮膚用薬

第2類医薬品