

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
(2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

お問い合わせ・発売元

新大和漢方株式会社 福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

TEL:0120-702-866 (午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

製造販売元

東光薬品工業株式会社 東京都足立区新田2丁目16番23号

製造
番号
使用
期限

かゆみを伴う乾燥性皮膚に

わ じゅん ほ ご こう
和潤保護膏



新大和漢方株式会社

第2類医薬品

120g

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2.次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3.2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

第2類医薬品 販売名:和潤保護膏 内容量 120g

【効 能】かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用 法】1日1～数回、適量を患部に塗擦してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用させないでください (3)外用にのみ使用してください

【成 分】100g中 尿素……20g リドカイン………2g
ジフェンヒドラミン……1g グリチルレチン酸…0.3g
トコフェロール酢酸エステル………0.5g

添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、 ℓ -メントール、香料



副作用被害救済制度

TEL:0120-149-931

