

# かゆみを伴う乾燥性皮膚の治療に パレスタミン20DX

尿素20%+かゆみ止め成分W配合クリーム

有効成分が  
乾燥肌の  
繰り返す  
かゆみを抑え、  
しっとり潤い肌へ

かゆみ止め成分

W配合

ジフェンヒドラミン  
リドカイン

消炎成分

グリチルレチン酸


保湿成分

尿素20%


+VE配合

第2類医薬品

皮膚やわらか成分(尿素)などが  
うるおいのあるお肌になります



2種類のかゆみ止め成分が  
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



## 【保管および取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感ができることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造販売元

三友薬品株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆

お客様相談窓口 03-3899-9333



ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

#### 2. 次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位  
(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

## 5つの有効成分配合

かゆみ止め成分  
ジフェンヒドラミン

かゆみ止め成分  
リドカイン

消炎成分  
グリチルレチン酸

血行促進成分  
トコフェロール  
酢酸エステル

保湿成分  
尿素20%

【効 能】 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用 法】 1日1~数回、適量を患部に塗擦してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用させないでください (3)外用にのみ使用してください

【成 分】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g  
添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、*l*-メントール、香料

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931