

ここから  
開けてください

## こんな症状に効果的です

- お風呂上がりで血行が良くなるとかゆくなる
- 寒さが増し空気が乾燥してくるとかゆくなる
- 衣類の刺激などでかゆくなる

## 5つの成分が配合されています

尿素20%  
うるおい  
保湿成分

リドカイン  
かゆみ止め  
成分

ジフェニヒドラミン  
かゆみ止め  
成分

水分をとりこみ  
皮ふを柔らかくします

局所麻酔剤と抗ヒスタミン剤が  
Wでかゆみを抑えます


グリチル  
レチン酸  
消炎成分

トコフェロール  
酢酸エスティル  
血行促進  
成分


皮ふの炎症を  
鎮めます

皮ふの新陳代謝を  
高めます

皮膚やわらか成分(尿素)などが  
うるおいのあるお肌にします



2種類のかゆみ止め成分が  
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



## [使用上の注意]

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起したことがある人  
2. 次の部位には使用しないでください  
(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位(3)かさぶたのように皮ふがはがれています(4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師・薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師・薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師・薬剤師または登録販売者にご相談ください

発売元  
**ラクール薬品販売株式会社**  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元  
**三友 薬品 株式 会 社**  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

## ナデーム20DX ローション

かゆみ止め成分W配合

# 20%尿素 乳液

かゆみを伴う  
乾燥性皮ふの治療に

尿素20%  
保湿成分

リドカイン  
かゆみ止め成分

ジフェニヒドラミン  
かゆみ止め成分

120g

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

### 【効能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

### 【用法】

1日1~数回、適量を患部に塗布してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください

(2)小児(15歳未満)には使用せないでください

(3)外用のみ使用してください

### 【成 分】

100g中  
尿 素 ..... 20g  
リドカイン ..... 2g  
ジフェニヒドラミン ..... 1g  
グリチルレチン酸 ..... 0.3g  
トコフェロール酢酸エスティル ..... 0.5g  
添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エドヒ酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリストン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、メントール、香料

### 【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください(2)小児の手の届かない所に保管してください(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)キャップの閉め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造  
番号

使用  
期限