

5つの成分が配合されています

尿素20%
うるみ
保湿成分
リドカイン
かゆみ止め
成分
ジフェン
ヒドラミン
かゆみ止め
成分
グリチル
レチン酸
消炎成分
トコフェロール
酢酸エステル
血行促進
成分

【効能】 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用法】 1日1~数回、適量を患部に塗擦してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください(2)小児(15歳未満)には使用させないでください(3)外用にのみ使用してください

【成分】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g 添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、φ-メントール、香料

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所(4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

Claudia Jansen

尿素20%+かゆみ止め成分W配合クリーム

ラクケストDX 120g

Moisturizing dry skin
and removing itchiness

第2類医薬品

Claudia Jansen

尿素20%+かゆみ止め成分W配合クリーム

ラクケストDX 120g

Moisturizing dry skin
and removing itchiness

かゆみを
Wでおさえ、
しっとりお肌へ


尿素
20%
配合

かゆみ止め成分
リドカイン

かゆみ止め成分
ジフェン
ヒドラミン

第2類医薬品

C



皮膚やわらか成分(尿素)がうるおいのあるお肌になります

2種類のかゆみ止め成分が乾燥肌によるかゆみを鎮めます

【保管および取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造
番号
使用
期限

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3899-9333

