

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【効能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用法】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください

(2)小児(15歳未満)には使用させないでください

(3)外用にのみ使用してください

【成分】100mg中

- 尿素……………20g
- リドカイン……………2g
- ジフェンヒドラミン……………1g
- グリチルレチン酸……………0.3g
- トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
- 添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エドト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシド、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、*l*-メントール、香料

【保管および取扱上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください(2)小児の手の届かない所に保管してください(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)キャップの開め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造番号

使用期限



尿素20%+かゆみ止め成分W配合乳液

ラクケストDX ローション 120g

Moisturizing dry skin and removing itchiness

かゆみをWでおさえ、
しっとりお肌へ

尿素
20%
配合

かゆみ止め成分
リドカイン

かゆみ止め成分
ジフェンヒドラミン

第2類医薬品

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかけ傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所(4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください



製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号


◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3899-9333

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)


ここから
開けてください

5つの成分が 配合されています

- 尿素20%
うるおい
保湿成分
- グリチル
レチン酸
消炎成分
- リドカイン
かゆみ止め
成分
- トコフェロール
酢酸エステル
血行促進
成分
- ジフェン
ヒドラミン
かゆみ止め
成分



皮膚がやわらか成分(尿素)がうるおいのあるお肌になります



2種類のかゆみ止め成分が乾燥肌によるかゆみを鎮めます