

大容量
120g

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感があるのでありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

製造
番号
使用
期限



乾燥肌によるかゆみに効く

セーラス Serus DA20 クリーム タイプ

2つのかゆみ止め成分配合

ジフェンヒドラミン + リドカイン

乾いた肌に尿素 20% がうるおいを与える

第2類医薬品

尿素20%(保湿成分)
の働きにより固くなった皮
ふに水分を取り込みます

2つのかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮
めます

ジフェンヒドラミン

リドカイン

- 【使用上の注意】
- してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
 2. 次の部位には使用しないでください
(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)
- 【効能】かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)
- 【用法】1日1~数回、適量を患部に塗擦してください
(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用せないでください (3)外用にのみ使用してください
- 【成分】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g
添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、l-メントール、香料

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。