

2018年7月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

皮膚軟化薬

第3類医薬品

ヒフナップ20CE

手指がかさかさする、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしが固くコチコチになる、水仕事などで肌がザラザラするといった症状は、皮膚表面の角質層の水分不足が原因です。

ヒフナップ20CEは、角質水分保有力増強作用のある尿素20%に、消炎作用のあるグリチルレチン酸を配合したクリームです。「かさかさ」「コチコチ」「ザラザラ」の皮膚を改善します。

〈ヒフナップ20CEの特徴〉

- 20%の尿素が、体内から角質層へ適度の水分を取り込み、皮膚の水分バランスを保ちます。
- 親水性のクリーム剤ですので水で洗い流せます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)引っかき傷の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬や化粧品などにより刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態等

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は

使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。
- (5)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品などの目的で顔面には使用しないでください。
- (6)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

成分・分量

100g中

成分	分量
尿素	20.0g
グリチルレチン酸	0.3g

添加物として、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、ステアリン酸ソルピタン、

セタノール、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、パラベン、香料、その他4成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

内容量

75g

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2

販売名：ヒフナップ20CE

40g

【成分・分量】(100g中)

第3類医薬品

尿素…20.0g グリチルレチン酸…0.3g

添加物として、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキエチルヘキサデカナミド、ステアリン酸ソルビタン、セタノール、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、パラベン、香料、その他4成分を含有します。

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

【効能・効果】手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)小児(15歳未満)には使用させないでください。(4)本剤は外用にのみ使用してください。(5)化粧品ではないので、効能・効果が定められた患部のみに使用し、基礎化粧品などの目的で顔面には使用しないでください。(6)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかとのカサカサに。

〔乾燥肌と角化症の治療薬〕

第3類医薬品 40g

セラミドS
配合

スクワラン
入り基剤使用

チューブタイプ

押し
あける

グリチルレチン酸0.3%
尿素20%配合クリーム

ヒフナップ20CE

⚠【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください(1)目の周囲、粘膜等。(2)引っかき傷の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。(3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。(4)炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。



相談すること 1.次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)薬や化粧品などにより刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態等

3.2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お客様相談室

☎058-246-8771

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2



製造
番号
使用
期限



4 962307 092088