

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

〈乾燥性皮膚治療薬〉

エピナール

第2類医薬品

◆ 私たちの体を覆っている皮膚は、環境の変化により外界のさまざまな刺激にさらされています。また、近年エアコン等の普及により一年中部屋の空気が乾燥するようになり、室内においても皮膚が乾燥してかゆみが生じる方が増えています。

◆ **エピナール** は、乾燥した肌に水分を保持する働きを持つ尿素、トコフェロール酢酸エステルに、かゆみ止め成分のリドカイン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、d-カンフルを配合した広くのびてベタつかずステロイドを含まないクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目のまわり、粘膜等。
- (2) 傷口、または赤くはれているところ。
- (3) ただれやひび割れのひどいところ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かゆみをともなう乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量（100g中）

成 分	含量	は た ら き
尿素	10.0g	角質の水分保持能力を高めます。また、かたくなった皮膚をやわらかくします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用によりかゆみをしずめます。
d-カンフル	1.0g	患部に清涼感を与え、かゆみや炎症をしずめます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行を良くし、組織の修復を助けます。

添加物として、ポリオキシエチレンソルビタンステアレート、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度开封した後はなるべく早くご使用ください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店または下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 **0598-30-5376**

受付時間 10:00～17:00

（ただし、土、日、祝祭日は除きます。）

発売元

小林薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142