

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

メディケージュ

M E D I C A N E (皮膚軟化薬) 第3類医薬品



- 健康な皮膚は、適度の水分量を保っていますが、エアコンなどによる空気の乾燥・冷え、水仕事、老化による保水力・柔軟性の低下などの原因により皮膚表面の水分が失われると、皮膚が荒れてかさかさやコチコチの状態になります。
- メディケージュは、荒れた角質層にしみこんで体の中からも水分を取り込み、肌をやわらかくする「尿素」を20%、血流を改善して新陳代謝を高める「ビタミンE」、荒れて炎症をおこした皮膚の腫れを鎮める「グリチルリチン酸モノアンモニウム」を配合した、硬くなった肌をやわらかくして乾燥した肌をしっとりさせる、荒れたお肌の治療薬です。メディケージュは、基剤にも保湿効果のあるスクワランを配合し、敏感肌の方にも使っていたけりよう無香料・無着色のさっぱりとした使用感のクリーム剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれている所。
- (4) 炎症部位(ただれ、赤く腫れている所)。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかた・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。
- (6) 患部やその周辺を汚れたまま使用しないでください。



裏面もお読みください。


【成分・分量・はたらき】(100g中)

成分	100g中	はたらき
尿素	20g	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮膚にしっとり感を与えます。また、乾燥してかさかさになった角質層表面をなめらかにします。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.5g	末梢の血行を促して、皮膚表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮膚表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮膚が生まれます。
グリチルリチン酸 モノアンモニウム	0.5g	患部の炎症を、修復しながら鎮めます。

※添加物として、ステアリルアルコール、セタノール、2,2',2"-ニトロトリエタノール、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、スクワラン、パラフィンを含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いします。
万協製薬株式会社「お客様相談室」 電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00(ただし、土、日、祝日を除きます。)

販売元

 **サンドラッググループ**

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142